

Cargo: P02 - CLÍNICA MÉDICA

Disciplina: Clínica Médica

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
41	Piperacilina/tazobactam + azitromicina	O enunciado apresenta o caso de um paciente com doença estrutural (DPOC), critérios de gravidade para pneumonia comunitária e uso recente de antibiótico. Desse modo, as opções com levofloxacino e cefuroxima e claritromicina (isolada) não são apropriadas. Em função do risco de germes atípicos, não se recomenda beta-lactâmicos isoladamente. Desse modo, das opções apresentadas, a terapia mais apropriada é piperacilina-tazobactam com aзитromicina.	INDEFERIDO	-
48	Angiotomografia da artéria pulmonar	O caso apresentado ilustra uma parada cardíaca após uma cirurgia ortopédica. A principal hipótese é embolia pulmonar. Em um cenário de pós-operatório imediato, a cintilografia e o d-dímero apresentam muitos resultados falso-positivos. A TC permite maior acurácia para TEP e maior possibilidade de diagnósticos diferenciais, sendo o método de escolha.	INDEFERIDO	-
56	Nódulos não funcionantes > 1,5 cm de diâmetro devem ser submetidos à punção aspirativa por agulha fina	Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca esclarece que além do tamanho do nódulo, características ultrassonográficas, como vascularização e conteúdo (hiper x hipocóico) influem na decisão sobre punccionar ou não (punção aspirativa por agulha fina) – FIGURA 405-13 Cap 405. Medicina Interna de Harrison. Ed Anthony Fauci, J.Larry Jameson, Dennis Kasper, Dan Longo, Joseph Loscalzo. 19a ed. 2015. Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e conseqüente anulação da questão.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: P04 - CIRURGIA GERAL

Disciplina: Clínica Médica

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
41	Piperacilina/tazobactam + azitromicina	O enunciado apresenta o caso de um paciente com doença estrutural (DPOC), critérios de gravidade para pneumonia comunitária e uso recente de antibiótico. Desse modo, as opções com levofloxacino e cefuroxima e claritromicina (isolada) não são apropriadas. Em função do risco de germes atípicos, não se recomenda beta-lactâmicos isoladamente. Desse modo, das opções apresentadas, a terapia mais apropriada é piperacilina-tazobactam com aзитromicina.	INDEFERIDO	-
56	Nódulos não funcionantes > 1,5 cm de diâmetro devem ser submetidos à punção aspirativa por agulha fina	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que além do tamanho do nódulo, características ultrassonográficas, como vascularização e conteúdo (hiper x hipoeicoico) influem na decisão sobre punccionar ou não (punção aspirativa por agulha fina) – FIGURA 405-13 Cap 405. Medicina Interna de Harrison. Ed Anthony Fauci, J.Larry Jameson, Dennis Kasper, Dan Longo, Joseph Loscalzo. 19a ed. 2015. Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca decide pelo deferimento e consequente anulação da questão.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: P05 - DERMATOLOGIA

Disciplina: Clínica Médica

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
41	Piperacilina/tazobactam + azitromicina	O enunciado apresenta o caso de um paciente com doença estrutural (DPOC), critérios de gravidade para pneumonia comunitária e uso recente de antibiótico. Desse modo, as opções com levofloxacino e cefuroxima e claritromicina (isolada) não são apropriadas. Em função do risco de germes atípicos, não se recomenda beta-lactâmicos isoladamente. Desse modo, das opções apresentadas, a terapia mais apropriada é piperacilina-tazobactam com aзитromicina.	INDEFERIDO	-
56	Nódulos não funcionantes > 1,5 cm de diâmetro devem ser submetidos à punção aspirativa por agulha fina	Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca esclarece que além do tamanho do nódulo, características ultrassonográficas, como vascularização e conteúdo (hiper x hipoeoico) influem na decisão sobre punccionar ou não (punção aspirativa por agulha fina) – FIGURA 405-13 Cap 405. Medicina Interna de Harrison. Ed Anthony Fauci, J.Larry Jameson, Dennis Kasper, Dan Longo, Joseph Loscalzo. 19a ed. 2015. Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente anulação da questão.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: P07 - PEDIATRIA

Disciplina: Clínica Médica

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
41	Piperacilina/tazobactam + azitromicina	O enunciado apresenta o caso de um paciente com doença estrutural (DPOC), critérios de gravidade para pneumonia comunitária e uso recente de antibiótico. Desse modo, as opções com levofloxacino e cefuroxima e claritromicina (isolada) não são apropriadas. Em função do risco de germes atípicos, não se recomenda beta-lactâmicos isoladamente. Desse modo, das opções apresentadas, a terapia mais apropriada é piperacilina-tazobactam com aзитromicina.	INDEFERIDO	-
56	Nódulos não funcionantes > 1,5 cm de diâmetro devem ser submetidos à punção aspirativa por agulha fina	Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca esclarece que além do tamanho do nódulo, características ultrassonográficas, como vascularização e conteúdo (hiper x hipoeoico) influem na decisão sobre punccionar ou não (punção aspirativa por agulha fina) – FIGURA 405-13 Cap 405. Medicina Interna de Harrison. Ed Anthony Fauci, J.Larry Jameson, Dennis Kasper, Dan Longo, Joseph Loscalzo. 19a ed. 2015. Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente anulação da questão.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: P08 - PSQUIATRIA

Disciplina: Clínica Médica

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
41	Piperacilina/tazobactam + azitromicina	O enunciado apresenta o caso de um paciente com doença estrutural (DPOC), critérios de gravidade para pneumonia comunitária e uso recente de antibiótico. Desse modo, as opções com levofloxacino e cefuroxima e claritromicina (isolada) não são apropriadas. Em função do risco de germes atípicos, não se recomenda beta-lactâmicos isoladamente. Desse modo, das opções apresentadas, a terapia mais apropriada é piperacilina-tazobactam com aзитromicina.	INDEFERIDO	-
56	Nódulos não funcionantes > 1,5 cm de diâmetro devem ser submetidos à punção aspirativa por agulha fina	Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca esclarece que além do tamanho do nódulo, características ultrassonográficas, como vascularização e conteúdo (hiper x hipoeoico) influem na decisão sobre puncionar ou não (punção aspirativa por agulha fina) – FIGURA 405-13 Cap 405. Medicina Interna de Harrison. Ed Anthony Fauci, J.Larry Jameson, Dennis Kasper, Dan Longo, Joseph Loscalzo. 19a ed. 2015. Sendo assim, a banca decide pelo deferimento e consequente anulação da questão.	DEFERIDO	ANULADA
58	colonoscopia, mamografia e citopatológico de colo uterino	Como consta no enunciado da questão, o caso se refere a uma mulher de 60 anos ("Leia o caso clínico a seguir e responda às questões 58 e 59. Uma mulher de 60 anos, na menopausa, comparece à consulta para avaliação clínica geral"). Nessa idade, o recomendado é colonoscopia, mamografia e citopatológico de colo uterino.	INDEFERIDO	-