

Cargo: M04 - ALUNO SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS - SAÚDE - TEC. ENFERMAGEM

Disciplina: Conhecimentos Específicos

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
51	Somente as afirmativas I e II estão corretas.	<p>De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, o profissional tem o direito de “obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem”, conforme recorte abaixo:</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO I DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS DIREITOS</p> <p>Art. 1º – Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.</p> <p>Art. 2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.</p> <p>Art. 3º – Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.</p> <p>Art. 4º – Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.</p> <p>Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.</p>	INDEFERIDO	-
52	Bactéria – para aerossóis	As precauções por aerossóis são medidas recomendadas para impedir a transmissão de microrganismos por pequenas partículas, com tamanho inferior 5 µm (aerossóis), que podem permanecer suspenso no ar por longos períodos de tempo, dispersando-se com maior facilidade a grande distância, podendo ser inaladas e causar infecção em indivíduo susceptível. São exemplos de precauções por aerossóis as seguintes doenças: tuberculose pulmonar ou laríngea; varicela; herpes zoster disseminado ou com lesões extensas em pacientes imunossuprimidos; e situações especiais (e.g., influenza aviária e Gripe A durante procedimento em vias aéreas). O tipo de precaução não está diretamente relacionado ao tipo de microrganismo causador da doença, mas à forma de transmissão.	INDEFERIDO	-
53	Orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.	De acordo com a Lei do exercício profissional cabe especialmente ao técnico de enfermagem “participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar” ,	INDEFERIDO	-

		<p>conforme trecho abaixo:</p> <p>Art. 12 – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente:</p> <p>§ 1º Participar da programação da assistência de Enfermagem;</p> <p>§ 2º Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei;</p> <p><u>§ 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar;</u></p> <p>§ 4º Participar da equipe de saúde.</p> <p>Art. 13 – O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente:</p> <p>§ 1º Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;</p>		
56	É contra indicada para crianças menores de 6 meses de idade.	A questão solicita a afirmativa correta em relação à vacina contra febre amarela. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde essa vacina não deve ser administrada em crianças menores de 6 meses, conforme trecho a seguir, retirado do Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação:	INDEFERIDO	-

		<p>3.10.4 Contraindicação</p> <p>A vacina FA está contraindicada nas situações gerais referidas nesta Parte IV do Manual (no tópico 2) e também:</p> <ul style="list-style-type: none"> • para crianças menores de 6 meses de idade; • para o imunodeprimido grave, independentemente do risco de exposição; • portadores de doenças autoimunes (consulte o Manual de EAPV). <p>Precauções</p> <ul style="list-style-type: none"> • A vacina febre amarela não está indicada para gestantes e mulheres que estejam amamentando, devendo a vacinação ser adiada até a criança completar 6 meses de idade. Na impossibilidade de se adiar a vacinação, deve-se avaliar o benefício pelo risco. Em caso de mulheres que estejam amamentando e receberam a vacina, o aleitamento materno deve ser suspenso preferencialmente por 28 dias após a vacinação (com um mínimo de 15 dias). • Esta vacina também não está indicada para indivíduos com doenças autoimunes ou doença neurológica ou com 60 anos ou mais que serão vacinados pela primeira vez. No entanto, em situação de risco de se contrair a doença, deve-se avaliar o benefício da vacinação. • Existe reação anafilática após a ingestão de ovo de galinha. A vacinação deve ser feita em ambiente hospitalar após avaliação médica. 		
58	Termômetro.	De acordo com o Manual de Orientações Gerais para Central de Material e Esterilização do Ministério da Saúde, o único artigo apresentado na questão e que pode ser considerado não crítico é o termômetro , pois só necessita de desinfecção de médio ou baixo nível. O inalador, máscara de ambú e cânula de guedel são considerados artigos semicríticos, pois necessitam , de desinfecção de alto nível ou esterilização, e o laparoscópio é considerado artigo crítico, pois entra em contato direto com tecidos ou tratos estéreis e precisam passar pelo processo de esterilização.	INDEFERIDO	-
59	24 horas.	De acordo com o Manual da ANVISA Medidas de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, uma das recomendações para prevenir infecção da corrente sanguínea é a troca do equipo de nutrição parenteral a cada 24 horas, conforme recorte a seguir:	INDEFERIDO	-
		<p>6.4.4 Troca do equipo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infusão contínua – proceder a troca a cada 72-96h (AII). • Infusões intermitentes – proceder a troca a cada 24h (AIII). • Nutrição parenteral – proceder a troca a cada 24 h (AI). • Emulsões lipídicas – proceder a troca a cada 24h (AI). • Administração de sangue e hemocomponentes – proceder a troca a cada bolsa (AII). • O sistema de infusão deve ser trocado na suspeita ou confirmação de IPCS (AI). 		

