

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Página 1 de 3

Cargo: B01 - Cirurgião Dentista 20h

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
32 - X / 46 - Y / 41 - Z	As estruturas possíveis de serem vistas em uma radiografia panorâmica convencional são anomalias dentárias, doenças ocultas, cáries de grande extensão, doença periodontal e a ATM. Apresentadas nas páginas 270 e 271 do livro Radiologia Oral Fundamentos e Interpretação de WHITE e PHAROAH. Em uma projeção bidimensional como a radiografia panorâmica convencional não é possível avaliar expansão óssea. Cáries proximais incipientes devem ser diagnosticadas com exames mais específicos para esta região como radiografia periapicais ou radiografias interproximais. As condições de expansão óssea e cáries proximais incipientes não são diagnosticadas com precisão pela radiografia panorâmica. Portanto, a banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
33 - X / 42 - Y / 35 - Z	Para o cálculo anestésico do anestésico local articaína a 4% deve-se levar em consideração a dosagem máxima (7mg/kg) e aproximar o valor mais baixo. Sendo assim, o número total e seguro de tubetes seria de 2 tubetes. De acordo com Eduardo Dias de Andrade na 3ª Edição do Livro Terapêutica Medicamentosa em Odontologia de 2013, nas páginas 139-140, portanto, a banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
34 - X / 38 - Y / 49 - Z	De acordo com Eduardo Dias de Andrade na 3ª Edição do Livro Terapêutica Medicamentosa em Odontologia de 2013, na página 140, a dose da Dipirona recomendada para crianças é de 15mg/kg ao dia. Totalizando quatro doses diárias aplicadas de 4 em 4 horas para controle da dor leve a moderada, portanto, a banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
35 - X / 49 - Y / 48 - Z	Os cistos gengivais do recém-nascido são pequenos, superficiais e com conteúdo de ceratina, que são encontrados na mucosa alveolar de crianças. Esses cistos se originam dos remanescentes da lâmina dental. De acordo com Brad Neville na 3ª Edição do Livro Patologia Oral e Maxilofacial de 2009, na página 692. Os nódulos de Bohn estão espalhados pelo palato duro, muitas vezes próximo à junção entre os palatos, e acredita-se que sejam derivados de glândulas salivares menores de pacientes recém-nascidos. De acordo com Brad Neville na	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Página 2 de 3

	3ª Edição do Livro Patologia Oral e Maxilofacial de 2009, na página 26. Portanto, a banca resolve indeferir o recurso.		
36 - X / 50 - Y / 45 - Z	O cimento de óxido de zinco e eugenol do tipo II está indicado para cimentação provisória de longa duração de próteses fixas de acordo com a especificação ANSI/ADA nº 30 ou ISO 3107 descrita na página 331 do livro Phillips Materiais Dentários de 2013 do autor Anusavice. Para obturações provisórias o cimento de óxido de zinco e eugenol indicado é o tipo IV. Para obturação provisória e bases isolantes térmicas o cimento de óxido de zinco e eugenol indicado é o tipo III. Para cimentação provisória o cimento de óxido de zinco e eugenol indicado é o tipo I. O cimento de óxido de zinco e eugenol do tipo II está indicado para cimentação provisória de próteses fixas de longa duração e não para próteses fixas de curta duração, portanto, a banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
39 - X / 41 - Y / 38 - Z	A questão se refere a temperatura mais indicada. O tempo e temperatura mais indicados para o processo de esterilização por meio do calor seco das estufas são 60 minutos a uma temperatura de 170°C proposto por Antenor Araújo no livro Aspectos atuais da Cirurgia e Traumatologia Bucamaxilofacial de 2007. Página 22. Portanto, a banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
48 - X / 32 - Y / 42 - Z	Segundo o livro Terapêutica medicamentosa em odontologia (3ª Ed, 2014), página 83, já foi demonstrado em estudo clínico que a administração de doses terapêuticas de paracetamol para pacientes tratados com varfarina pode provocar um aumento do efeito anticoagulante desta última, predispondo o paciente a hemorragias. Isso é devido ao paracetamol interferir no sistema de enzimas hepáticas (citocromo P450) que metaboliza a varfarina, aumentando sua concentração plasmática. Por esse motivo, a prescrição de paracetamol, na forma pura ou em associações (com codeína, por exemplo), deve ser evitada para pacientes que façam uso contínuo de varfarina. Na bula do medicamento varfarina sódica, há relação de corticosteroides com potencialização e inibição do efeito anticoagulante da mesma. Entretanto no enunciado da questão, é solicitado qual droga pode provocar um aumento do efeito anticoagulante, não sendo citado em nenhum momento, a inibição desse efeito. Outro ponto, segundo o livro Terapêutica medicamentosa em odontologia (3ª Ed, 2014), página 83, há uma chance de predispor o paciente a hemorragias com o uso do paracetamol associado à varfarina, o que não é citado na bula da varfarina sódica em relação ao uso	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE
Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	concomitante de corticosteroides. Portanto, a banca resolve indeferir o recurso.		
--	--	--	--