

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Página 1 de 1

Cargo: B02 - Cirurgião Dentista 40h

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
34 - X / 35 - Y / 32 - Z	De acordo com Eduardo Dias de Andrade na 3ª Edição do Livro Terapêutica Medicamentosa em Odontologia de 2013, na página 140, a dose da Dipirona recomendada para crianças é de 15mg/kg ao dia. Totalizando quatro doses diárias aplicadas de 4 em 4 horas para controle da dor leve a moderada, portanto, a banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
36 - X / 48 - Y / 49 - Z	O cimento de óxido de zinco e eugenol do tipo II está indicado para cimentação provisória de longa duração de próteses fixas de acordo com a especificação ANSI/ADA nº 30 ou ISO 3107 descrita na página 331 do livro Phillips Materiais Dentários de 2013 do autor Anusavice. Para obturações provisórias o cimento de óxido de zinco e eugenol indicado é o tipo IV. Para obturação provisória e bases isolantes térmicas o cimento de óxido de zinco e eugenol indicado é o tipo III. Para cimentação provisória o cimento de óxido de zinco e eugenol indicado é o tipo I. O cimento de óxido de zinco e eugenol do tipo II está indicado para cimentação provisória de próteses fixas de longa duração e não para próteses fixas de curta duração, portanto, a banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
39 - X / 41 - Y / 50 - Z	A questão se refere a temperatura mais indicada. O tempo e temperatura mais indicados para o processo de esterilização por meio do calor seco das estufas são 60 minutos a uma temperatura de 170°C proposto por Antenor Araújo no livro Aspectos atuais da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de 2007. Página 22. Portanto, a banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
40 - X / 44 - Y / 37 - Z	O fórceps nº 65 é aconselhado para pequenos ápices dentários abandonados e raízes vestibulares de molares superiores, por ter pontas ativas arredondadas e mais estreitas proposto por Antenor Araújo no livro Aspectos atuais da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de 2007. Página 41. Os fórceps nº 150 e 151, também chamados universais, são indicados para as extrações de todos os dentes unirradiculares. O fórceps nº 17 é mais usado para os molares inferiores que são geralmente os mais bifurcados nos lados vestibular e lingual. O fórceps nº 23, denominado “chifre de vaca” é também usado para molares inferiores, sendo mais indicado quando esses dentes se apresentam sem coroa. Para as extrações de molares superiores sem destruição são indicados os fórceps de nº 18. Portanto, a banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO