

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Cargo: B08 - Enfermeiro 30h

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
41 - X / 32 - Y / 42 - Z	<p>De acordo com o livro Manual Obstétrico da editora Corpus, página 56 temos: A consulta pré-natal é feita por um profissional para uma assistência adequada estabelecendo um vínculo do profissional com seu cliente. O cálculo da DPP é um método recomendado pelo MS que leva em consideração a data da última menstruação (DUM) é ou não reconhecida pela mulher. Uma das regras da DUM é: Somar 7 dias ao 1º dia da última menstruação. Subtrair 3 meses do mês da DUM ou somar 9 meses ao mês da DUM. De acordo com os dados do enunciado da questão teremos o seguinte cálculo: Regra 01 DUM: 07/07/2019 Regra: <u>+ 7 dias – 3 meses</u> DPP: 14/04/2020</p> <p>Regra 02 DUM: 07/07/2019 Regra: <u>+ 7 dias + 9 meses</u> DPP: 14/04/2020</p> <p>Embora a formulação da questão esteja correta, a data está errada, pois seria 07/07/19, batendo com a resposta de gabarito letra A 14/04/2020. Porém, devido a um erro material, a data da DUM está 07/05/2019, não havendo nenhum gabarito disponível com a data 14/02/2020. Sendo assim para que não paire dúvidas posteriores, a banca resolve DEFERIR o recurso.</p>	DEFERIDO	ANULADA
40 - X / 48 - Y / 43 - Z41	<p>PRECAUÇÕES PADRÃO 1. Devem ser utilizadas para todos os pacientes independentemente da presença ou ausência de doenças transmissíveis comprovada. Higienização das mãos: antes e após contato com o paciente, após contato com sangue, outros líquidos orgânicos, e itens contaminados; após a retirada de luvas, entre um paciente e outro e no mesmo paciente, caso haja risco de contaminação cruzada entre diferentes sítios anatômicos. Conforme item I.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Luvas: usar luvas limpas, quando houver possibilidade de contato com sangue, outros líquidos ou itens e superfícies contaminados; trocar de luvas entre procedimentos; retirar as luvas após o uso e lavar as mãos obrigatoriamente. Conforme item III

Máscara e óculos de proteção: recomendados para proteção individual, durante procedimentos que envolvam riscos de respingos. Diferente do que é afirmado no item IV, pois, a N95 só é usada em casos de pacientes com suspeita ou confirmação de doenças que são transmitidas por via aérea com partículas < 5u.

Material perfuro-cortante: manusear com cuidado os materiais perfuro-cortantes, proceder o descarte adequado em recipientes rígidos e resistentes à perfuração. Seguir adequadamente as orientações para montagem e preenchimento destes recipientes, não ultrapassando o limite indicado. Conforme descrito no item II. Desse modo apenas a letra E encontra-se correta conforme gabarito oficial. Sendo assim não há erros que justifique a anulação da questão, desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos

42 - X / 47 - Y / 36 - Z

De acordo com Departamento de Hipertensão Arterial – sociedade Brasileira de Cardiologia, disponível no link:
<http://departamentos.cardiol.br/dha/consenso3/capitulo1.asp> temos:

Critérios Diagnósticos e Classificação

Qualquer número é arbitrário e qualquer classificação, insuficiente. A necessidade de sistematização obriga uma definição operacional para separar indivíduos sãos dos doentes. Na realidade, podemos ter maior ou menor risco cardiovascular tanto acima como abaixo do número limítrofe, quando o paciente é considerado individualmente. Pelo exposto, enfatiza-se a necessidade de extrema cautela antes de rotular alguém como hipertenso, tanto pelo risco de falso-positivo como pela repercussão na própria saúde do indivíduo e o custo social resultante. Aceita-se como normal para indivíduos adultos (com mais de 18 anos de idade) cifras inferiores a 85 mmHg de pressão diastólica e inferiores a 130 mmHg de pressão sistólica (Tabela II).

Tabela II. Classificação diagnóstica da hipertensão arterial (adultos com mais de 18 anos de idade).

PAD (mmHg)	PAS (mmHg)	Classificação
< 85	< 130	Normal
85-89	130-139	Normal limítrofe
90-99	140-159	Hipertensão leve (estágio 1)
100-109	160-179	Hipertensão moderada (estágio 2)
> 110	> 180	Hipertensão grave (estágio 3)
< 90	> 140	Hipertensão sistólica isolada

Desse modo, apenas as letras D e F encontram-se incorretas.

DEFERIDO

ANULADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Página 3 de 4

	Embora a formulação da questão esteja correta bem como o item apresentado como correto no gabarito oficial, há um erro material de digitação da letra C do quadro que seria 140-159 e está 40-159. Sendo assim para que não paire dúvidas posteriores, a banca resolve DEFERIR o recurso.		
49 - X / 33 - Y / 44 - Z	De acordo com Brunner e Suddarth 13ª volume 02, 2017, página 2140 podemos observar: Cobra venenosas (peçonhentas) causaram mais de 2.800 picadas nos EUA. Em todo o mundo, mais de 50.000 picadas de cobra ocorrem a cada ano e aproximadamente, 7.000 dessas serão venenosas. O veneno da cobra é composto principalmente por proteínas e apresenta uma gama substancial de efeitos fisiológicos. Pode afetar diversos sistemas de órgãos, especialmente os sistemas neurológicos, cardiovascular e respiratório. Embora o envenenamento seja raro, ele pode ocorrer. É essencial a avaliação dos sinais e sintomas progressivos antes de considerar a administração do soro antiofídico, que é mais eficaz se administrado em até 4 horas e em não mais que 12 horas após a picada da cobra conforme descrito no gabarito oficial de letra D. Sendo assim não há erros que justifique a anulação da questão, desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
50 - X / 42 - Y / 46 - Z	De acordo com o calendário de vacinação do Adulto d Ministério da Saúde(MS), podemos observar: É muito importante que os adultos mantenham suas vacinas em dia. Além de se proteger, a vacina também evita a transmissão para outras pessoas que não podem ser vacinadas. Imunizados, familiares podem oferecer proteção indireta a bebês que ainda não estão na idade indicada para receber algumas vacinas, além de outras pessoas que não estão protegidas. Veja lista de vacinas disponibilizadas a adultos de 20 a 59 anos: Hepatite B - 3 doses (a depender da situação vacinal anterior) Febre Amarela – dose única (a depender da situação vacinal anterior). Conforme gabarito de letra E. Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – Verificar a situação vacinal anterior, se nunca vacinado: receber 2 doses (20 a 29 anos) e 1 dose (30 a 49 anos); Dupla adulto (dT) (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos Pneumocócica 23 Valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – 1 dose (Está indicada para população indígena e grupos-alvo específicos). Desse modo, apenas a letra E encontra-se correta e as letras A, B, C e D estão erradas, pois não existem reforço dessa vacina a cada 5 anos, não são administradas em dose única sem reforço nem em 4 doses e não há a necessidade de administra-la sempre que for em área endêmica. Sendo assim	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES – QUADRO SAÚDE
Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Página 4 de 4

não há erros que justifique a anulação da questão, desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos		
---	--	--