

Cargo: P09 - UROLOGIA

Disciplina: Cirurgia Geral

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
17	obstrução tubular por pigmento de mioglobina	A questão foi formulada segundo o Tratado de Cirurgia de Sabiston, 18. Edição cap. 15 pág.327. Dentre as alternativas apresentadas, a única correta é o gabarito, restando as demais, incorretas. A existência de discordância por parte de outra fonte da literatura não invalida o que está colocado no Tratado de Cirurgia mais utilizado em todas as faculdades de medicina em todo o mundo. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.	INDEFERIDO	-
24	a esplenectomia diminui a taxa de hemólise e leva à resolução da anemia, devendo ser realizada após o quarto ano de vida.	Em resposta ao recurso interposta, temos a dizer que a questão foi formulada segundo o Tratado de Cirurgia de Sabiston 18 edição cap. 56 pag. 1529. Dentre as alternativas apresentadas, a única correta é o gabarito, restando as demais, incorretas. A existência de uma fonte bibliográfica ou artigo discordando em parte, não invalida o que está colocado no Tratado de Cirurgia mais utilizado em todas as faculdades de medicina em todo o mundo. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.	INDEFERIDO	-
33	as úlceras anais da sífilis costumam ser dolorosas e sem exsudato, podem ser únicas ou múltiplas e localizadas na região perianal, canal anal e reto distal.	A coloproctologia é a especialidade cirúrgica que abrange o tratamento das patologias do cólon, reto e anus. Faz parte do conhecimento do cirurgião geral, noções sólidas de coloproctologia. As úlceras anais são patologias do âmbito da coloproctologia. Podem ser causadas por variados fatores, entre eles o câncer. O cirurgião geral, com noções sólidas de coloproctologia, deverá fazer o diagnóstico diferencial entre as patologias ulcerosas do reto e ânus. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.	INDEFERIDO	-
35	O diagnóstico de CFT não pode ser firmado pela punção aspirativa com agulha fina, sendo necessário o estudo histopatológico de invasão da cápsula e vasos sanguíneos.	A questão foi formulada segundo o Tratado de Cirurgia de Sabiston 18. Edição cap. 36 pág. 884. Dentre as alternativas apresentadas, a única correta é o gabarito, restando as demais, incorretas. O carcinoma folicular da tireoide não pode ser diagnosticado pela PAAF. Não existe apenas um tipo histológico de câncer de tireoide. Sendo assim, fica confirmada a assertividade da questão.	INDEFERIDO	-