

Cargo: M12 - SAPATEIRO ORTOPÉDICO

Disciplina: Conhecimentos Específicos

| Questão | Gabarito por extenso | Justificativa | Conclusão (Deferido ou Indeferido) | Resposta Alterada para: |
|---------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| 38 | tibial posterior. | A causa mais comum do pé plano valgo no adulto é a insuficiência do tendão do tibial posterior. Sendo o tendão parte integrante do músculo (conhecimento da área básica da anatomia, parte integrante do edital do concurso), é correto dizer que o pé plano é secundário à insuficiência do tibial posterior. O fato do flexor longo do hálux ser coadjuvante da flexão plantar não o torna uma alternativa válida por não haver correlação deste com pé plano, sendo o tibial posterior a única alternativa correta. | INDEFERIDO | - |
| 49 | gesso de contato total. | Conforme descrito tanto na referência bibliográfica apresentada pelo candidato no recurso (artigo "Atenção integral ao portador de pé diabético") quanto no livro Campbell's Operative Orthopaedics 12ª Ed, pág 4058, o gesso de contato total supera todas as opções de palmilhas ou órteses de uso em sapatos comuns, e se mantém como medida inicial e padrão ouro no tratamento de úlceras de pressão em pés diabéticos. | INDEFERIDO | - |