

Cargo: P02 - CLÍNICA MÉDICA

Disciplina: MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:																									
3	Ciprofloxacim	<p>Em resposta ao recurso interposto, a banca esclarece que conforme o Quadro 3, exposto à página 47 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 2016, no capítulo 1, Doença Meningocócica, os esquemas preconizados são os relacionados a seguir.</p> <p style="text-align: center;">Quadro 3 – Esquema quimioprolático indicado para doença meningocócica</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Droga</th> <th>Idade</th> <th>Dose</th> <th>Intervalo</th> <th>Duração</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Rifampicina</td> <td><1 mês</td> <td>5mg/kg/dose</td> <td>12 em 12 horas</td> <td rowspan="2">2 dias</td> </tr> <tr> <td>Crianças ≥1 mês e adultos</td> <td>10mg/kg/dose (máximo de 600mg)</td> <td>12 em 12 horas</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ceftriaxona</td> <td><12 anos</td> <td>125mg; intramuscular</td> <td colspan="2" rowspan="2">Dose única</td> </tr> <tr> <td>≥12 anos</td> <td>250mg; intramuscular</td> </tr> <tr> <td>Ciprofloxacino</td> <td>>18 anos</td> <td>500mg; uso oral</td> <td colspan="2">Dose única</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sendo assim, permanece o gabarito oficial e considera-se improcedente o recurso impetrado..</p>	Droga	Idade	Dose	Intervalo	Duração	Rifampicina	<1 mês	5mg/kg/dose	12 em 12 horas	2 dias	Crianças ≥1 mês e adultos	10mg/kg/dose (máximo de 600mg)	12 em 12 horas	Ceftriaxona	<12 anos	125mg; intramuscular	Dose única		≥12 anos	250mg; intramuscular	Ciprofloxacino	>18 anos	500mg; uso oral	Dose única		INDEFERIDO	-
Droga	Idade	Dose	Intervalo	Duração																									
Rifampicina	<1 mês	5mg/kg/dose	12 em 12 horas	2 dias																									
	Crianças ≥1 mês e adultos	10mg/kg/dose (máximo de 600mg)	12 em 12 horas																										
Ceftriaxona	<12 anos	125mg; intramuscular	Dose única																										
	≥12 anos	250mg; intramuscular																											
Ciprofloxacino	>18 anos	500mg; uso oral	Dose única																										
5	Vômitos persistentes	Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o pedido de recurso é improcedente. Conforme enfatizado à página 439 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 2016, no capítulo 7, Dengue, dentre as alternativas apresentadas, a resposta correta é mesmo a ocorrência de “Vômitos persistentes”. Desta forma fica confirmada a assertividade da questão e de seu respectivo gabarito.	INDEFERIDO	-																									
9	Colocar 2 gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água e aguardar 30 minutos para beber a água.	Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o pedido de recurso é improcedente, tendo em vista que das alternativas apresentadas, a considerada gabarito é a única correta. Conforme texto à página 238 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 2016, no capítulo 7, Cólera, o tratamento da água no domicílio deve ser feito da seguinte maneira: colocar 2 gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água e aguardar 30 minutos para beber a água. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.	INDEFERIDO	-																									
15	notificação compulsória	Conforme texto à página 469 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 2016, no capítulo	INDEFERIDO	-																									

	imediate	7, Febre do Chikungunya, a doença é de notificação compulsória imediata. Corroborando a assertiva acima, acesso ao portal do Ministério da Saúde (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/1073-chikungunya/15386-notificacao-de-casos) no dia em que o presente recurso foi observado pelo autor da questão (02 de fevereiro de 2017) evidenciou o seguinte: "...Os casos suspeitos de Chikungunya devem ser comunicados e/ou notificados em até 24 horas a partir da suspeita inicial..." Sendo assim, permanece o gabarito oficial e a resposta correta é "notificação compulsória imediata".		
18	Abscessos subcutâneos frios	Para atender ao princípio de isonomia e transparência, temos a esclarecer que conforme texto à página 238 do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, 7ª edição, de 2009, no capítulo sem número, sobre "eventos adversos pós-vacinais", tanto a ocorrência de úlceras com diâmetro maior que 01 cm quanto de abscessos frios podem ser tratados com isoniazida. Sendo assim, por haver duas respostas plausíveis, igualmente corretas, a banca decide pela anulação da questão.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: P04 - CIRURGIA GERAL

Disciplina: MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
9	Colocar 2 gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água e aguardar 30 minutos para beber a água.	Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o pedido de recurso é improcedente, tendo em vista que das alternativas apresentadas, a considerada gabarito é a única correta. Conforme texto à página 238 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 2016, no capítulo 7, Cólera, o tratamento da água no domicílio deve ser feito da seguinte maneira: colocar 2 gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água e aguardar 30 minutos para beber a água. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.	INDEFERIDO	-
15	notificação compulsória imediata	Conforme texto à página 469 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 2016, no capítulo 7, Febre do Chikungunya, a doença é de notificação compulsória imediata. Corroborando a assertiva acima, acesso ao portal do Ministério da Saúde (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/1073-chikungunya/15386-notificacao-de-casos) no dia em que o presente recurso foi observado pelo autor da questão (02 de fevereiro de 2017) evidenciou o seguinte: “...Os casos suspeitos de Chikungunya devem ser comunicados e/ou notificados em até 24 horas a partir da suspeita inicial...” Sendo assim, permanece o gabarito oficial e a resposta correta é “notificação compulsória imediata”.	INDEFERIDO	-
18	Abscessos subcutâneos frios	Em resposta ao pedido de recurso, a banca esclarece que conforme texto à página 238 do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, 7ª edição, de 2009, no capítulo sem número, sobre “eventos adversos pós-vacinais”, tanto a ocorrência de úlceras com diâmetro maior que 01 cm quanto de abscessos frios podem ser tratados com isoniazida. Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente anulação, em razão da questão apresentar duas respostas plausíveis, igualmente corretas.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: P05 - DERMATOLOGIA

Disciplina: MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
9	Colocar 2 gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água e aguardar 30 minutos para beber a água.	Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o pedido de recurso é improcedente, tendo em vista que das alternativas apresentadas, a considerada gabarito é a única correta. Conforme texto à página 238 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 2016, no capítulo 7, Cólera, o tratamento da água no domicílio deve ser feito da seguinte maneira: colocar 2 gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água e aguardar 30 minutos para beber a água. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.	INDEFERIDO	-
15	notificação compulsória imediata	Conforme texto à página 469 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 2016, no capítulo 7, Febre do Chikungunya, a doença é de notificação compulsória imediata. Corroborando a assertiva acima, acesso ao portal do Ministério da Saúde (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/1073-chikungunya/15386-notificacao-de-casos) no dia em que o presente recurso foi observado pelo autor da questão (02 de fevereiro de 2017) evidenciou o seguinte: “...Os casos suspeitos de Chikungunya devem ser comunicados e/ou notificados em até 24 horas a partir da suspeita inicial...” Sendo assim, permanece o gabarito oficial e a resposta correta é “notificação compulsória imediata”.	INDEFERIDO	-
18	Abscessos subcutâneos frios	Para atender ao princípio de isonomia e transparência, temos a esclarecer que conforme texto à página 238 do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, 7ª edição, de 2009, no capítulo sem número, sobre “eventos adversos pós-vacinais”, tanto a ocorrência de úlceras com diâmetro maior que 01 cm quanto de abscessos frios podem ser tratados com isoniazida. Sendo assim, por haver duas respostas plausíveis, igualmente corretas, a banca decide pela anulação da questão.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: P07 - PEDIATRIA

Disciplina: MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
18	Abscessos subcutâneos frios	Para atender ao princípio de isonomia e transparência, temos a esclarecer que conforme texto à página 238 do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, 7ª edição, de 2009, no capítulo sem número, sobre "eventos adversos pós-vacinais", tanto a ocorrência de úlceras com diâmetro maior que 01 cm quanto de abscessos frios podem ser tratados com isoniazida. Sendo assim, por haver duas respostas plausíveis, igualmente corretas, a banca decide pela anulação da questão.	DEFERIDO	ANULADA

Cargo: P08 - PSQUIATRIA

Disciplina: MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
9	Colocar 2 gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água e aguardar 30 minutos para beber a água.	Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o pedido de recurso é improcedente, tendo em vista que das alternativas apresentadas, a considerada gabarito é a única correta. Conforme texto à página 238 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 2016, no capítulo 7, Cólera, o tratamento da água no domicílio deve ser feito da seguinte maneira: colocar 2 gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água e aguardar 30 minutos para beber a água. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.	INDEFERIDO	-
15	notificação compulsória imediata	Conforme texto à página 469 do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 2016, no capítulo 7, Febre do Chikungunya, a doença é de notificação compulsória imediata. Corroborando a assertiva acima, acesso ao portal do Ministério da Saúde (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/1073-chikungunya/15386-notificacao-de-casos) no dia em que o presente recurso foi observado pelo autor da questão (02 de fevereiro de 2017) evidenciou o seguinte: “...Os casos suspeitos de Chikungunya devem ser comunicados e/ou notificados em até 24 horas a partir da suspeita inicial...” Sendo assim, permanece o gabarito oficial e a resposta correta é “notificação compulsória imediata”.	INDEFERIDO	-
18	Abscessos subcutâneos frios	Em resposta ao pedido de recurso, a banca esclarece que conforme texto à página 238 do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, 7ª edição, de 2009, no capítulo sem número, sobre “eventos adversos pós-vacinais”, tanto a ocorrência de úlceras com diâmetro maior que 01 cm quanto de abscessos frios podem ser tratados com isoniazida. Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente anulação, em razão da questão apresentar duas respostas plausíveis, igualmente corretas.	DEFERIDO	ANULADA