

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Cargo: M12 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Disciplina: Conhecimentos Específicos

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
43 - X / 38 - Y / 41 - Z	A oximetria de pulso é uma forma não invasiva de verificação da saturação de oxigênio pela hemoglobina (SpO2). Nela, os valores normais estão entre 95% a 100%. Logo o valor de 90% já corresponde alguma alteração clínica ou hemodinâmica no paciente. Por todos os motivos supracitados a Banca Resolve INDEFERIR OS RECURSOS.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
48 - X / 45 - Y / 36 - Z	De acordo com a ANVISA sobre as contra-indicações relacionadas a vacinação destaca-se: 1.3.1.1. Contra-indicações gerais As vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados não devem ser administradas, a princípio, em pessoas: a) com imunodeficiência congênita ou adquirida; b) acometidas por neoplasia maligna c) em tratamento com corticosteróides em esquemas imunodepressores (por exemplo, 2mg/kg/dia de prednisona durante duas semanas ou mais em crianças ou doses correspondentes de outros glicocorticóides) ou submetidas a outras terapêuticas imunodepressoras (quimioterapia antineoplásica, radioterapia, etc). 1.3.2. Falsas contra-indicações Não constituem contra-indicação à vacinação:	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	<p>a) doenças benignas comuns, tais como afecções recorrentes infecciosas ou alérgicas das vias respiratórias superiores, com tosse e/ou coriza, diarreia leve ou moderada, doenças da pele (impetigo, escabiose etc);</p> <p>b) desnutrição;</p> <p>c) aplicação de vacina contra a raiva em andamento;</p> <p>d) doença neurológica estável (síndrome convulsiva controlada, por exemplo) ou progressiva, com seqüela presente;</p> <p>e) antecedente familiar de convulsão;</p> <p>f) tratamento sistêmico com corticosteróide durante curto período (inferior a duas semanas), ou tratamento prolongado diário ou em dias alternados com doses baixas ou moderadas;</p> <p>g) alergias, exceto as reações alérgicas sistêmicas e graves, relacionadas a componentes de determinadas vacinas;h) prematuridade ou baixo peso no nascimento.</p> <p>Logo a única resposta correta na questão é a doença maligna. Pelos motivos supracitados a Banca Resolve INDEFERIR OS RECURSOS.</p>		
<p>50 - X / 43 - Y / 37 - Z</p>	<p>Segundo a ANVISA A precaução padrão deve ser utilizada para todos os tipos de pacientes, independente da suspeita ou não de infecções. Sendo precedidas de higienização das mãos, uso de luvas e avental, óculos e máscara e caixa perfuro cortante. A transmissão se dá através de contato e gotículas. Por todos os motivos supracitados a Banca Resolve INDEFERIR OS RECURSOS.</p>	<p>INDEFERIDO</p>	<p>GABARITO MANTIDO</p>