

Cargo: S03 - ENFERMEIRO

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
39	Provoque debilidade temporária de membro.	<p>A questão trata das infrações previstas no Código de Ética de Enfermagem (Resolução COFEN 311/2007), conforme recorte abaixo:</p> <p>Art. 121 – As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.</p> <p>§ 1º – São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.</p> <p>§ 2º – São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros.</p> <p>§ 3º – São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa.</p>	INDEFERIDO	-
40	Determinação dos resultados que se espera alcançar.	<p>De acordo com a Resolução COFEN-358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, na etapa de Planejamento de Enfermagem ocorre a determinação dos resultados que se espera alcançar, conforme recorte a seguir:</p> <p>III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.</p>	INDEFERIDO	-
42	5,6 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intermediária.	<p>A questão foi baseada na Resolução COFEN-293/2004. Porém, esta foi atualizada pela Resolução COFEN Nº 0527/2016, que muda o dimensionamento para a assistência intermediária de 5,6 para 6 horas. Sendo assim, por não haver gabarito entre as alternativas apresentadas, a banca resolve pela anulação da questão.</p>	DEFERIDO	ANULADA
47	45% de área corporal queimada	<p>A resposta correta seria “63% de área corporal queimada”, sendo assim, não há gabarito entre as alternativas apresentadas. Diante do exposto, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente anulação da questão.</p>	DEFERIDO	ANULADA

49	TCE grave.	A escala de coma de Glasgow é um instrumento utilizado para a classificação do traumatismo cranioencefálico e do nível de consciência de pacientes comatosos. Nos dois casos são analisadas as respostas a estímulos específicos e atribuído uma pontuação de acordo com os achados. A pontuação final considera a soma dos três testes que, no caso do TCE, pode ser leve, moderado e grave. Um ou outro achado pode estar presente em classificações diferentes, uma vez que a avaliação final considera, nesse caso, a soma final das respostas obtidas.	INDEFERIDO	-
50	Pré-eclâmpsia grave.	De acordo com os manuais de atenção ao pré-natal do Ministério da Saúde e com o Manual Básico de Obstetrícia (2010), os sintomas apresentados na questão são característicos de pré-eclâmpsia grave. No caso específico da pressão arterial, considera-se para essa condição valores $\geq 160 \times 110$ mmHg (igual ou maior que 160x110). Em relação a HELLP síndrome, trata-se do desequilíbrio metabólico sistêmico que se desencadeia como uma complicação da pré-eclâmpsia, e não a pré-eclâmpsia em si.	INDEFERIDO	-
51	72 horas da exposição.	De acordo com o Manual de Exposição a Materiais Biológicos do Ministério da Saúde, estudos estabeleceram que a PEP não é efetiva quando indicada acima de 72 horas após a exposição e são a base para que os trabalhadores da saúde atendidos com mais de 72 horas após a evolução não sejam elegíveis para esta quimioprofilaxia.	INDEFERIDO	-
52	30 dias entre a 1ª e a 2ª dose e 6 meses entre a 1ª e a 3ª dose.	A questão está de acordo com os itens <b>risco ocupacional relacionado à exposição de agentes biológicos e biossegurança</b> , pois trata-se de uma medida de proteção ao profissional exposto a um determinado risco ocupacional.	INDEFERIDO	-
53	Todas as lesões tornarem-se crostas.	De acordo com os Manuais de Prevenção e Medidas de Prevenção de Infecções baseados no Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, CDC, 2007, a precaução/proteção usada pelo profissional de saúde no cuidado a um paciente com varicela, deve ser mantida até que todas as lesões tornem-se crostas.	INDEFERIDO	-
54	Tuberculose pulmonar.	De acordo com os Manuais de Prevenção e Medidas de Prevenção de Infecções baseados no Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, CDC, 2007 e com as recomendações da ANVISA, a máscara PFF2 (N95) deve ser usada nos casos em que se necessita de precaução para aerossóis, que é o caso da tuberculose. Já a influenza requer precaução para gotículas, nesse caso o uso de máscara cirúrgica é suficiente.	INDEFERIDO	-

55	0,6 mL.	<p>A questão requer noções básicas de administrações de medicamentos que envolvem conhecimentos sobre diluição e equivalência de doses, abordando um problema bem comum na saúde brasileira: a falta de material apropriado. No caso apresentado é necessário administrar 30 UI de insulina, o que seria bem simples com seringas de 1 ml, como o que tem disponível são seringas de 3 ml será necessário diluir esse medicamento e recalculá-lo a dose a ser administrada. A questão disponibiliza todas as orientações e dados necessários, restando ao candidato fazer um cálculo simples de regra de 3 para chegar à dose que será administrada.</p> <p>Dados fornecidos:  Frascos de insulina de 10ml com 100UI/ml  Diluição de 1ml de insulina em 1 ml de AD com isso 100UI/ml passa a ser 100UI/2ml  Aplicando a regra de 3</p> $\begin{array}{l} 100\text{UI} \text{ -----} 2\text{ml} \\ 30\text{UI} \text{ -----} x \\ 100\text{UI} \cdot x = 2 \times 30 \\ 100\text{UI} \cdot X = 60 \\ X = 60/100 \text{ UI} \\ X = 0,6 \text{ UI} \end{array}$	INDEFERIDO	-
57	Somente a afirmativa I está correta.	<p>Afirmar que a Política Nacional de Atenção às Urgências prioriza o atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas e gineco-obstétricas é dizer que esses atendimentos têm primazia sobre os demais, o que torna a afirmativa falsa, pois a Política não prevê esse tipo de privilégio. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.</p>	INDEFERIDO	-
59	Somente a afirmativa I está correta.	<p>De acordo com o Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, ao fazer a medição padrão deve-se acrescentar 15 cm à sonda nasogástrica e 20 a 25 cm à sonda intestinal. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.</p>	INDEFERIDO	-
60	Cetoacidose diabética.	<p>O foco da questão é o padrão respiratório apresentado pelo paciente, cujas características indicam a presença de respiração de Kussmaul. Esse padrão é encontrado nos pacientes em coma diabético, é uma respiração com hiperventilação que tenta compensar a acidose diabética. Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado.</p>	INDEFERIDO	-