

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM / ES

PROVA DISCURSIVA

CARGO: S17 - MÉDICO PSQUIATRA

A Prova Discursiva possui caráter eliminatório e classificatório e valerá 20 (vinte) pontos.

Para efeito de avaliação da Prova Discursiva, serão considerados os aspectos formal, textual e técnico e os itens de avaliação discriminados a seguir.

ASPECTOS	ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA	PONTOS
1) Formal	Domínio da norma culta da língua, no seu registro formal; pontuação, ortografia, concordância, regência, uso adequado de pronomes, emprego de tempos e modos verbais.	2
2) Textual	Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, paragrafação; uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, observância da estrutura sintático-semântica dos períodos.	2
3) Técnico	Compreensão da proposta, seleção e organização de argumentos, progressão temática coerente, propriedade vocabular, demonstração de conhecimento relativo ao assunto específico tratado na questão, concisão, clareza, apropriação produtiva e autoral do recorte temático.	16
TOTAL		20

PADRÃO DE RESPOSTA

A) Resposta esperada – cada item vale $\frac{1}{4}$ da pontuação total da questão:

- Paciente apresenta cinco ou mais sintomas presentes na questão: humor deprimido na maior parte dos dias indicado por relato subjetivo, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, perda de peso significativo sem estar fazendo dieta ou redução do apetite quase todos os dias, insônia ou dificuldade para adormecer quase todos os dias, pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida.
- Os sintomas estão presentes por duas semanas ou mais e representam uma mudança do funcionamento anterior do paciente.
- Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo do funcionamento social ou profissional do indivíduo.
- O episódio não é atribuível aos efeitos de qualquer substância ou outra condição médica.

B) Resposta esperada- cada item vale $\frac{1}{2}$ da pontuação total da questão:

-Pelo menos (4) – Boca seca, cefaleia, alteração gastrointestinal (diarreia ou diminuição do apetite ou náusea ou dor abdominal), insônia, nervosismo ou ansiedade, sudorese excessiva, disfunção sexual ou diminuição da libido, tremor.

- Ideação suicida ou aumento risco suicídio- pelo menos 2 modos de manejar- acompanhamento regular (menor intervalo entre consultas), iniciar com uma dose mais baixa da medicação (aumento gradual da dose), falar com a esposa do paciente sobre esse risco de suicídio e orientar sobre o mesmo na primeira marcação, manejar o risco do paciente morar em prédio pedindo para ficar casa de algum parente no início do tratamento ou avaliando proteção do paciente quanto ao risco de pular do prédio, conversar com paciente e avaliar se o mesmo apresenta durante consultas plano de suicídio, combinar com o paciente de entrar em contato com o serviço de saúde ou médico caso apresente ideação suicida mais intensa.