

**Cargo: S20 - MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRÍCIA**

**Disciplina: Conhecimentos Específicos**

| Questão | Gabarito por extenso  | Justificativa   | Conclusão<br>(Deferido ou Indeferido) | Resposta<br>Alterada para: |
|---------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 51      | Achados mamográficos benignos.  | A imagem está claramente caracterizada. Pode-se observar um fibroadenoma parcialmente calcificado nos quadros A e B; calcificações vasculares em C e um linfonodo intramamário em D, todos achados tipicamente benignos e compatíveis com BI-RADS® 2.   | INDEFERIDO                            | -                          |
| 54      | Repetição periódica de propedêutica laboratorial materna e biofísica fetal. | A mais recente revisão da Cochrane sobre o emprego de anti-hipertensivos para o tratamento de gestantes com pré-eclampsia leve mostrou que não há evidência para sua adoção.<br><a href="http://www.cochrane.org/CD002252/PREG_antihypertensive-drug-therapy-for-mild-to-moderate-hypertension-during-pregnancy">http://www.cochrane.org/CD002252/PREG_antihypertensive-drug-therapy-for-mild-to-moderate-hypertension-during-pregnancy</a><br>Saliento que o CHIPS trial citado no recurso estudou mulheres com hipertensão gestacional, com proteinúria menor que 300mg/24h, o que não condiz com o caso apresentado em que há proteinúria associada.<br>Por fim, saliento que a questão é abordada no clássico livro Rezende-Obstetrícia Fundamental, 14ª edição de 2018, página 341, que corrobora esse pensamento, não recomendando o emprego de anti-hipertensivos em pacientes com pré-eclampsia leve. | INDEFERIDO                            | -                          |
| 55      | Amniotomia + parto vaginal  | O tratamento do descolamento prematuro de placenta normalmente inserida é questão abordada no clássico livro Rezende-Obstetrícia Fundamental, 14ª edição de 2018, página 421, que recomenda cesariana apenas para gestações com feto vivo e mais de 23 semanas de gestação. Na questão apresenta-se um feto com 22 semanas de gestação, em que se recomenda a amniotomia e o parto vaginal.   | INDEFERIDO                            | -                          |