



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
Estratégia de Saúde da Família – ESF

MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CÓDIGO DA PROVA

S03T

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE ROBERT H. SCHULLER PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Se não existe possibilidade de fracasso, então a vitória é insignificante.”

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 30 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor da questão
Sistema Único de Saúde - SUS	15	2
Conhecimentos Específicos	15	4

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Questão 01

São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica:

- A) participar do processo de mapeamento da área de atuação da equipe, identificando as famílias que se encontram fora da abrangência.
- B) definir o território de atuação e da população sob responsabilidade das unidades de saúde e das equipes.
- C) desenvolver ações que priorizem os grupos de risco direcionando-os aos cuidados dos níveis assistenciais mais complexos.
- D) realizar o acolhimento com escuta qualificada orientando o usuário na busca de serviços não existentes na rede pública.
- E) desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população disciplinando o estilo de vida das pessoas.

Questão 02

A Estratégia de Saúde da Família tem como um de seus eixos estruturantes a(o):

- A) atuação conjunta com as lideranças comunitárias reforçando seus projetos.
- B) universalização do acesso aos programas sociais que contribuam para melhorar a saúde.
- C) busca de parcerias intersetoriais dentro da rede assistencial da saúde.
- D) construção de vínculo e responsabilização com a população usuária.
- E) cadastramento das famílias residentes na área e aferir o estilo de vida de seus membros.

Questão 03

Como estratégia para facilitar a adesão dos municípios ao SUS, a Norma Operacional Básica (NOB - SUS) de 1996 estabeleceu:

- A) diferentes modalidades de gestão dos sistemas de saúde locais.
- B) um novo sistema de regulação de vagas para casos graves.
- C) mecanismos de controle clínico e a verificação dos resultados terapêuticos.
- D) atenção especializada em caso de surtos epidêmicos de doenças infectocontagiosas.
- E) os protocolos para os fluxos de informação entre os níveis de complexidade que compõem a rede.

Questão 04

Entre os serviços essenciais para ser instituída uma Região de Saúde estão as ações e serviços de:

- A) atenção primária e urgência e emergência.
- B) atenção psicossocial e hospital de referência.
- C) atenção ambulatorial especializada e vigilância epidemiológica.
- D) ações de vigilância em saúde e hospitais universitários
- E) apoio diagnóstico e ações de prevenção.

Questão 05

Entre as prioridades estabelecidas pelo Pacto pela Saúde de 2006 está a(o):

- A) redução da mortalidade por agravos de notificação compulsória.
- B) fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias.
- C) garantia das internações em UTI quando necessário.
- D) controle das doenças respiratórias.
- E) mudança do perfil epidemiológico da população.

Questão 06

Um dos requisitos estabelecidos em lei é que os recursos investidos na saúde devem estar em conformidade com o(as):

- A) que está definido nos planos de saúde de cada ente da federação.
- B) prioridades determinadas pelos gestores locais.
- C) normativas do governo federal.
- D) prerrogativas da vigilância em saúde.
- E) políticas e programas da União.

Questão 07

No contexto da organização da rede assistencial do SUS, a atenção básica tem como uma de suas funções ser:

- A) responsável por atenuar os efeitos dos condicionantes e determinantes da saúde/doença.
- B) a instância de negociação da Comissão Integestores Bipartitepe.
- C) ordenadora do cuidado à saúde.
- D) responsável pela referência e contrarreferência.
- E) centrada em procedimentos e protocolos clínicos.

Questão 08

A diretriz da descentralização da política de saúde brasileira tem como objetivo tornar a gestão:

- A) coerente com a responsabilidade fiscal.
- B) planejada de acordo com o mapa da saúde.
- C) mais próxima dos cidadãos.
- D) humanizada e orientada pelo acolhimento.
- E) acessível aos órgãos de controle.

Questão 09

Segundo o que prevê o planejamento assistencial do SUS, o mapa da saúde é um instrumento:

- A) obrigatório para a iniciativa privada conveniada ao SUS e facultativo para unidades próprias.
- B) utilizado na identificação das necessidades de saúde e orienta o planejamento.
- C) essencial ao planejamento integrado dos entes federativos a nível municipal e regional sob supervisão da União.
- D) que redefine as metas planejadas quando estas não têm possibilidade de execução no nível local.
- E) disponibiliza recursos financeiros quando estes são insuficientes para arcar com os custos previstos para financiar a rede de serviços.

Questão 10

Qual das alternativas a seguir apresenta uma das condições essenciais para o acesso à assistência farmacêutica no SUS:

- A) ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
- B) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS ou estar em risco de morte sem o uso da medicação prescrita.
- C) ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS e ratificada pelo Conselho de Saúde.
- D) apresentar um laudo do médico assistente demonstrando a eficácia da medicação indicada para o caso do usuário solicitante.
- E) comprovar que o medicamento é a única terapêutica disponível para aquele agravo, ainda que em fase experimental.

Questão 11

No percurso da implementação do SUS, a Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS 01/02 buscou corrigir algumas distorções para aperfeiçoar a assistência prestada à população.

Esta Norma teve como ponto chave a(o):

- A) otimização dos recursos disponíveis e ociosos.
- B) introdução da participação social na gestão.
- C) busca da equidade através do aprofundamento da municipalização.
- D) processo de regionalização dos serviços.
- E) capacitação dos gestores e técnicos para atuar.

Questão 12

Constitui um dos fundamentos da atenção básica adscrever os usuários, garantindo a continuidade das ações de saúde e um cuidado:

- A) horizontal.
- B) longitudinal.
- C) flexível.
- D) terceirizado.
- E) especializado.

Questão 13

Uma das prioridades estabelecidas no Pacto pela Saúde é a saúde do idoso. O trabalho nesta área deve seguir algumas diretrizes, entre elas a(o):

- A) implantação de serviços de atenção domiciliar.
- B) acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco.
- C) retirada do idoso do convívio familiar, quando necessário para sua saúde.
- D) promoção do envelhecimento ativo e saudável através da medicalização dessa fase de vida.
- E) transferência dos cuidados aos idosos para as instituições hospitalares e asilares.

Questão 14

O SUS preconiza a estruturação de redes de serviços hierarquizadas. A organização dessa rede tem como um de seus parâmetros:

- A) a separação entre a assistência preventiva e a reabilitação.
- B) as supremacia das práticas curativas.
- C) a promoção da saúde com uso intensivo da tecnologia.
- D) o enfoque clínico-reabilitador da assistência.
- E) a ênfase nas ações de prevenção.

Questão 15

Os conselhos de saúde são órgãos que compõem a gestão da saúde a partir da Constituição de 1988. Que função tais órgãos cumprem no setor da saúde?

- A) Filantropia
- B) Democratização
- C) Repolitização
- D) Aumento da cobertura
- E) Redução de custos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

Com relação à Febre Amarela, é correto afirmar:

- A) Na forma leve/moderada está presente a Coagulação intravascular Disseminada.
- B) O período de incubação médio varia entre 3 e 6 dias, podendo ser de até 10 a 15 dias.
- C) Crianças menores de 6 meses de idade e pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico devem ser vacinados.
- D) O sinal de Faget é definido por taquicardia sem febre.
- E) Somente casos graves devem ter notificação compulsória e imediata.

Questão 17

Sobre as mudanças no Calendário de Vacinação 2018 pelo Ministério da Saúde, é correto afirmar:

- A) Entre as principais mudanças, está a aplicação da vacina contra a febre amarela para crianças nascidas a partir do ano de 2017, residentes em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia.
- B) Em relação à vacina contra a Varicela, o Ministério da Saúde passa a disponibilizar a segunda dose para crianças de 10 até 12 anos de idade.
- C) A vacina meningocócica C conjugada será disponibilizada preferencialmente para indivíduos com mais de 65 anos.
- D) No calendário de vacinação dos povos indígenas, as vacinas contra Febre Amarela e Rotavírus Humano deverão ser aplicadas ao nascer.
- E) As vacinas contra herpes tipo 1 (herpes oral), 2 (herpes genital) e 3 (herpes-zóster) deverão ser aplicadas em crianças de 4 até 6 anos de idade (6 anos, 11 meses e 29 dias).

Questão 18

Com relação à Fibrilação Atrial (FA), é correto afirmar que:

- A) betabloqueadores são droga de escolha para reversão da FA em ritmo sinusal.
- B) após os 30 anos, a prevalência da FA reduz com a idade.
- C) apneia obstrutiva do sono e obesidade são fatores de risco clínicos.
- D) episódios de FA, causados por ingesta excessiva de álcool ou crise tireotóxica, que reverteram ao ritmo sinusal espontaneamente ou após cardioversão elétrica, devem ser anticoagulados por 36 meses.
- E) a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo não deve ser considerada em pacientes com alto risco para fenômenos tromboembólicos e contraindicação ao uso de anticoagulante oral.

Questão 19

Um paciente hipertenso em uso de clonidina procura orientação médica, pois não consegue mais encontrar essa medicação nas farmácias. Uma alternativa, seguindo o mecanismo de ação e indicação da droga, seria a substituição por:

- A) memantina.
- B) nimesulida.
- C) gabapentina.
- D) hidralazina.
- E) galantamina.

Questão 20

Um idoso se queixa de edema nos membros inferiores, iniciado após o uso de uma medicação adicionada à sua receita no Posto de Saúde. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela relacionada a esse efeito colateral.

- A) Levotiroxina
- B) Levodopa
- C) Furosemida
- D) Atenolol
- E) Anlodipino

Questão 21

Os betabloqueadores tópicos são um dos principais medicamentos no tratamento do glaucoma. Com relação ao seu uso e propriedades farmacológicas é correto afirmar que:

- A) reduzem a produção do humor aquoso por meio da atuação nos processos ciliares, na perfusão capilar e na inibição da produção de monofosfato cíclico de adenosina estimulada pelas catecolaminas.
- B) os beta-1 seletivos (betaxolol, metoprolol) possuem ação hipotensora intraocular elevada, são mais efetivos e por isso preferíveis.
- C) os efeitos adversos são divididos em oculares e sistêmicos. A toxicidade sistêmica é menos frequente que a ocular, mas não desaparece com a interrupção da droga.
- D) história de asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva grave, bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus ou choque cardiogênico não são contraindicação ao seu uso.
- E) os efeitos respiratórios, como espasmos brônquicos e obstrução das vias respiratórias, estão relacionados à inibição dos receptores beta-1.

Questão 22

A Artrite Reumatoide (AR) no Brasil acomete quase um milhão de pessoas, predominantemente mulheres entre a quarta e sexta décadas de vida. Sobre a AR é correto afirmar que:

- A) a associação de AR, alopecia e cardiomegalia é chamada de Síndrome de Felty.
- B) o acometimento da coluna cervical (C1-C2), com subluxação atlantoaxial, manifesta-se por dor irradiada para a região lombar.
- C) as manifestações extra-articulares correlacionam-se com melhor prognóstico.
- D) início da doença em idade mais precoce, Fator Reumatoide ou anti-CCP em títulos elevados são indicativos de melhor prognóstico.
- E) a apresentação clínica mais comum é a poliartrite aguda com sinovite persistente nas mãos e rigidez matinal prolongada (mais de 2 horas).

Questão 23

Revisões sistemáticas recentes apontam taxas de demência na população brasileira variando de 5,1% a 17,5%, sendo a Doença de Alzheimer (DA) a causa mais frequente. Sobre a DA é correto afirmar:

- A) Idade e história familiar da doença não são fatores de risco.
- B) Hipertireoidismo e carência de vitamina B6 devem ser excluídos como diagnóstico diferencial.
- C) O diagnóstico definitivo de DA só pode ser realizado por necrópsia (ou biópsia).
- D) Os inibidores da acetilcolinesterase, donepezila, galantamina e rivastigmina, não são recomendados para o tratamento da DA leve a moderada.
- E) A Memantina, inibidores da acetilcolinesterase, deve ser iniciada com 20mg duas vezes ao dia.

Questão 24

Com relação à Doença de Parkinson (DP), é correto afirmar que:

- A) é uma doença degenerativa cujas alterações motoras decorrem, principalmente, da morte de neurônios dopaminérgicos da substância nigra, que apresentam inclusões intracitoplasmáticas conhecidas como corpúsculos de Lewy.
- B) o implante de estimulador cerebral profundo está indicado para pacientes portadores de comorbidades cardiovasculares, doenças oncológicas avançadas e cerebrovasculares.
- C) pacientes tratados com levodopa apresentam menor número de flutuações motoras e discinesias do que os tratados com pramipexol e cabergolina.
- D) pacientes acima de 70 anos não devem iniciar o tratamento sintomático com levodopa.
- E) a levodopa é o medicamento menos eficaz nas fases avançadas da doença.

Questão 25

Assinale a alternativa correta com relação ao adenocarcinoma do estômago.

- A) Um tumor tido como T2 invade a subserosa.
- B) A ecoendoscopia tem alto desempenho na avaliação de tumores superficiais (T1a versus T1b) e na avaliação do acometimento linfonodal.
- C) Sexo feminino, dieta rica em açúcares e produtos de origem vegetal estão associados ao aparecimento e desenvolvimento do câncer gástrico.
- D) O tipo difuso de Lauren acomete mais homens, em especial idosos, e evolui principalmente de lesões pré-malignas.
- E) Elevações de CA 72-4, CA 19-9 e CEA podem ser indicativos de doença extensa e de pior prognóstico.

Questão 26

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma doença crônica que afeta negativamente a vida dos doentes em diversas áreas, em especial no trabalho, no lazer e nos relacionamentos interpessoais. Sobre o TAB é correto afirmar:

- A) A característica definidora do TAB do tipo I é o episódio maníaco, podendo ou não haver episódios depressivos.
- B) A idade média de surgimento do TAB encontra-se entre 30 e 45 anos.
- C) O risco de suicídio é baixo em pacientes com TAB, em razão do componente maníaco.
- D) A combinação de carbonato de lítio com risperidona não deve ser indicada, pelo surgimento de hipertireoidismo e alucinações cenestésicas secundários.
- E) O episódio maníaco não deve ser tratado farmacologicamente, exceto em casos de tentativa de suicídio.

Questão 27

O Diabetes pode ser induzido por medicamentos ou agentes químicos, a alternativa que corretamente contém um exemplo é:

- A) apixabana.
- B) trimebutina.
- C) ivabradina.
- D) tiazídicos.
- E) entacapona.

Questão 28

Com relação à Doença Renal Crônica (DRC), é correto afirmar que:

- A) obesidade não é um fator de risco.
- B) hematúria de origem glomerular é marcador de dano renal parenquimatoso.
- C) taxa de filtração glomerular entre 60 e 80(mL/min/1,73 m²) define DRC estágio I.
- D) está recomendado para pacientes no estágio 1 redução da ingestão de proteínas para 0,5 g/Kg/dia em adultos.
- E) episódios frequentes de diverticulite são contraindicação absoluta para a diálise peritoneal.

Questão 29

Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), é correto afirmar que:

- A) pacientes com o mesmo grau de obstrução ao fluxo aéreo podem ter diferentes graus de dispneia.
- B) menos de 10% das exacerbações estão relacionadas aos vírus respiratórios.
- C) a associação β 2-agonista de longa duração (LABA) + Corticoide Inalatório não é indicada em pacientes com asma associada à DPOC.
- D) o roflumilaste, um inibidor seletivo da PDE4 (fosfodiesterase-4), não está indicado para tratamento de pacientes com DPOC grave e muito grave.
- E) o uso de carbapenêmicos através de nebulização está indicado em casos graves, associados a Choque Séptico pulmonar.

Questão 30

O oftalmoscópio é um importante instrumento para o clínico em seu consultório. Ao examinar um paciente com cefaleia, náuseas e vômito, observa-se veias retinianas ingurgitadas e tortuosas, disco óptico hiperemiado, edemaciado e com hemorragias retinianas em sua volta, mas não na periferia da retina. Dentre as alternativas a seguir, assinale a hipótese diagnóstica mais provável.

- A) Tumor de Frantz
- B) Febre Amarela
- C) Infecção pelo vírus Mayaro
- D) Infecção pelo vírus da Dengue
- E) Trombose do seio cavernoso