

Cargo: E01 - ENFERMEIRO

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
25	Somente a afirmativa II está correta.	De acordo com o caderno de controle dos cânceres do colo do útero e da mama do Ministério da Saúde, “embora usual, a recomendação de abstinência sexual prévia ao exame só é justificada quando são utilizados preservativos com lubrificante ou espermicidas. Na prática a presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica”.	INDEFERIDO	-
33	Atendimento médico em até 30 minutos.	De acordo com as instruções do Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária a Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, as situações identificadas como <b>urgência maior</b> requerem a primeira avaliação de enfermagem em até 10 minutos e <b>atendimento médico em até 30 minutos</b> .	INDEFERIDO	-
37	Somente as afirmativas I e III estão corretas.	A questão diz respeito ao protocolo de vacinação preconizado para as <b>gestantes</b> , ou seja, no período de gestação, que tem o objetivo de proteger não só a mãe, mas também o bebê. De acordo com calendário vigente da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a gestante não vacinada deverá receber a 1ª dose de dTpa adulto (20ª-36ª semanas) e as demais com dT, quando captada mais tardiamente. O calendário de 2017, divulgado pelo Ministério da Saúde, diz que as mulheres que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante o período gestacional devem receber uma dose da vacina no puerpério, o mais precocemente possível, o que não invalida os parâmetros apresentados na questão, que são preconizados para situações rotineiras.	INDEFERIDO	-
49	Esquema profilático com 2 doses da vacina antirrábica.	De acordo com esquema profilático preconizado pelo Ministério da Saúde e divulgado na página da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, ferimentos superficiais <b>em tronco e membros</b> , decorrentes de mordida de cachorro <b>com suspeita</b> de raiva, deve-se iniciar o esquema profilático com 2 doses. O esquema de 4 doses só se aplica, nesse caso, se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso.	INDEFERIDO	-