

**Cargo: U02 - DENTISTA**

**Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
21	a presença de substrato cariogênico, suscetibilidade do hospedeiro e colonização por microrganismos patogênicos.	Ao contrário do que o candidato alega não há duas alternativas com as mesmas opções de fatores determinantes para o desenvolvimento da doença cárie. Além disso a teoria de Keyes está correta em apenas uma das alternativas.	INDEFERIDO	MANTIDO O GABARITO
26	as soluções anestésicas devem conter um agente vasoconstritor, como a epinefrina, com o objetivo de retardar a absorção do sal anestésico, diminuindo sua toxicidade e aumentando a duração da anestesia.	As soluções anestésicas prilocaína e articaína, como defende o candidato, são contra indicadas para gestantes por estarem associadas à metahemoglobinemia, tanto na mãe quanto no feto, mas na opção considerada correta estamos avaliando apenas a presença ou não de vasoconstritores, e é amplamente defendido pelos autores que o uso vasoconstritores diminui a toxicidade e aumenta a duração das soluções anestésicas. Conforme a referência: MORAIS, Teresa Márcia Nascimento de e SILVA, Antônio da. Fundamentos da Odontologia em Ambiente Hospitalar/Uti. Capítulo 32 – cuidados do atendimento odontológico da gestante com comorbidades. Pág 301.	INDEFERIDO	MANTIDO O GABARITO
29	as caixas de descarte de perfurocortantes devem ser rígidas e impermeáveis, devem ficar em locais visíveis e de fácil acesso e deve-se preenchê-las na sua capacidade total antes do recolhimento.	É determinação da vigilância sanitária que não se preencha a caixa de descarte de perfurocortantes até sua capacidade total. É estabelecido que se mantenha as caixas de descarte dispostas em locais visíveis e de fácil acesso e não se preencha acima do limite de 2/3 de sua capacidade total. Conforme a referência: Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Cap.4. precauções padrão, pag. 39	INDEFERIDO	MANTIDO O GABARITO
30	dentre as viroses, a única a dispor de uma vacina eficaz (90% a 95% de resposta vacinal em adultos imunocompetentes) é a hepatite B, por isso, a principal medida de profilaxia é a vacinação pré-exposição.	Foi acatada a justificativa da candidata de que a pergunta se refere a procedimentos após a exposição à ocupacional com material biológico e a resposta se refere á medidas pré – exposição.	DEFERIDO	ANULADA

36	a principal vantagem das drogas inibidoras da COX-2 é a ausência de efeitos colaterais no trato gastrointestinal	<p>A questão 36 se baseou na referência bibliográfica Misch, Carl E. Implantes Dentais Contemporâneos. Cap. 21- Farmacologia em Implantodontia. Pág. 474-479. No quadro 21-4 está descrita a classificação de analgésicos na Odontologia, portanto quando a questão tratou de Inibidores de Ciclooxigenase-2 estava tranado, obviamente, das drogas seletivas. Além disso, a questão tratava do uso de anti-inflamatórios e analgésicos na rotina odontológica, e nesse contexto é correto afirmar que a principal vantagem das drogas inibidoras de COX-2 é a ausência de efeitos colaterais no trato gastrintestinal, visto que o benefício é menos evidente à longo prazo (além de 6 meses), e na rotina odontológica não prescrevemos estes medicamentos à longo prazo.</p> <p>Quanto ao uso de corticosteroides em pacientes diabéticos é amplamente contraindicado pela literatura, inclusive a utilizada e acima descrita, justamente pela sua ação anti-insulina e tendência a causar aumento da glicose sérica e glucosúria.</p>	INDEFERIDO	MANTIDO O GABARITO
38	o trespasse horizontal deve ser de 0 a 3 mm, pode haver espaços entre os dentes.	<p>A questão trata acerca das características de normalidade na dentição decídua, é correto declarar, portanto, que PODE haver espaços entre os dentes, pois a ausência de espaçamento entre os dentes decíduos por si só não pode ser considerada uma anormalidade, ou maloclusão.</p> <p>Conforme a referência: Guedes Pinto, Antônio Carlos. Odontopediatria. 9ª. edição. Cap 39.</p>	INDEFERIDO	MANTIDO O GABARITO